

أزميكسينال شراب

موسع للقصبات ومقشع

التركيب:

كل ٥ مل من شراب أزميكسينال تحتوي على:

سلفات التربوتالين ١,٢٥ ملغ

بروميكسين هيدروكلورايد ٤ ملغ

غوايفينيزين ٥٠ ملغ

منتول ٢,٥ ملغ

الخواص والتأثير:

يمتاز أزميكسينال بوجود:

سلفات التربوتالين: مقلد للودي ذو تأثير مباشر

انتقائي على مستقبلات بيتا ٢ الأدرنجية (منبه

بيتا ٢)، يعطى لخواصه الموسعة للقصبات في حال

انسداد الطرق التنفسية العكوس، كما يحدث في

الربو وفي بعض حالات الداء الرئوي الانسدادي

المزمن.

بروميكسين هيدروكلورايد: مذيّب للمخاط

يستخدم في علاج الاضطرابات التنفسية المترافقة

مع السعال المنتج.

غوايفينيزين: يزيد من حجم القشع ويقلل من

لزوجه، يستخدم كمقشع في السعال المنتج.

منتول: يخفف من أعراض التهاب القصبات

والتهاب الجيوب.

الاستطبابات:

أزميكسينال شراب مقشع وموسع للقصبات

يوصف للمصابين بالربو القصبي، التهاب القصبات

المزمن والنفخ الرئوي.

مضادات الاستطباب:

• الأشخاص الذين عندهم حساسية تجاه أحد

مركباته.

• مرضى البرفيرية.

• الأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد بالضغط

الشرياني أو المصابين بأمراض قلبية حادة.

الحمل والارضاع:

يعطى بحذر خلال فترة الحمل، ويحظر استعماله

في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وخلال فترة

الارضاع.

التأثيرات الجانبية:

• الجهاز الهضمي: إقياء- غثيان- عسر هضم-

إسهال.

• الجهاز القلبي الوعائي: خفقان- تسرع قلب.

• الجهاز العصبي المركزي والمحيطي: دوخة-

صداع- رعاش- نعاس.

في حالات نادرة جداً قد تحدث تفاعلات تحسسية.

التحذيرات والاحتياطات:

يعطى أزميكسينال بحذر للمرضى المصابين

بالسكري، الأمراض القلبية الوعائية بما فيها

ارتفاع الضغط الشرياني، فرط نشاط الدرق، الفشل

الكلوي والكبد.

يعطى أزميكسينال بحذر للمرضى الذين لديهم

سيرة مرضية للقرحة الهضمية.

يعطى أزميكسينال بحذر لمرضى الزرق مغلق

الزاوية.

يوصى بمراقبة تراكيز البوتاسيوم المصلية في

حالات الربو الشديدة خاصة التي يعطى فيها

أزميكسينال مع الثيوفيللين.

التداخلات الدوائية:

قد يزيد أزميكسينال من فعالية المضادات الحيوية

(التتراسيكلين والإريثرومايسين) نظراً لوجود

البروميكسين في تركيبه. الاستعمال المتزامن

مع الأدوية المقلدة للودي والثيوفيللين يقوي

من التأثير الدوائي ويزيد من احتمال التأثيرات

الجانبية للتربوتالين. ينصح بتجنب استعمال

أزميكسينال مع مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة

ومثبطات مونو أمين أوكسيداز.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

لللكبار: ملعقة كبيرة (١٠مل) ثلاث مرات يومياً.

للأطفال:

٢-٥ سنوات: نصف ملعقة صغيرة (٢,٥ مل) ثلاث

مرات يومياً.

٦-١٢ سنة: ملعقة صغيرة (٥ مل) ثلاث مرات

يومياً.

الحفظ:

يحفظ بدرجة حرارة الغرفة دون ٢٥°م، بعيداً عن

متناول الأطفال.

العبوة:

أزميكسينال شراب: عبوة زجاجية سعة ١٢٥ مل،

مع مقياس مدرج.

إن هذا الدواء

-الدواء مستحضر ولكنه ليس كغيره من المستحضرات.

-الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

-اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني

لدى صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضرره.

-لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب



ابن الهيثم
للصناعات الدوائية



حلب - سورية

www.ibn-alhaytham.com هاتف: ٥٢١٠٣٥٩ ٢١ (٠) ٩٦٣+

info@ibn-alhaytham.com فاكس: ٥٢١٠٣٣٥ ٢١ (٠) ٩٦٣+

AZMIXINAL Syrup

Bronchodilator & Expectorant

COMPOSITION:

Each 5 ml **AZMIXINAL** syrup contains:

Terbutaline sulfate	1.25 mg
Bromhexine HCl	4 mg
Guaifenesin	50 mg
Menthol	2.5 mg

PROPERTIES & ACTIONS:

AZMIXINAL contains:

Terbutaline sulfate, a direct-acting sympathomimetic with a selective action on beta-2 receptors (a beta-2 agonist). It is given for its bronchodilating properties in reversible airways obstruction, as occurs in asthma and in some patients with chronic obstructive pulmonary disease.

Bromhexine HCl, a mucolytic used in the treatment of respiratory disorders associated with productive cough.

Guaifenesin, which increases the volume and reduces the viscosity of tenacious sputum. It is used as an expectorant for productive cough.

Menthol, mainly used to relieve symptoms of bronchitis and sinusitis.

INDICATIONS:

AZMIXINAL syrup is a bronchodilator and expectorant, especially designated to treat bronchial asthma, chronic bronchitis, and emphysema.

CONTRAINDICATIONS:

- Patients with known hypersensitivity to any of the components.
- Patients with porphyria.
- Patients suffering from high blood pressure or acute heart diseases.

PREGNANCY AND LACTATION:

This drug should be used carefully during pregnancy. It is contraindicated during lactation and in the first three months of pregnancy.

SIDE EFFECTS:

- Digestive system: nausea, vomiting, dyspepsia, diarrhea.
- Cardiovascular system: palpitations, tachycardia.
- Central and peripheral nervous system: dizziness, headache, tremor, drowsiness.

Allergic reactions can be reported very seldom.

PRECAUTIONS & WARNINGS:

AZMIXINAL should be used with caution

in patients with diabetes mellitus, cardiovascular diseases including hypertension, hyperthyroidism, and in case of renal or hepatic failure.

AZMIXINAL should be used with care in patients with a history of peptic ulcer disease.

AZMIXINAL should be used with care in patients with closed angle glaucoma.

Careful monitoring of serum potassium is recommended in patients with severe asthma especially when theophylline and **AZMIXINAL** are given together.

DRUG INTERACTIONS:

As **AZMIXINAL** contains bromhexine, it may enhance the activity of the antibiotics (tetracycline and erythromycin). During concomitant administration with sympathomimetics and theophylline, the action is strengthened and the development risk of terbutaline side effects is increased. **AZMIXINAL** is not recommended to be used concomitantly with tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Adults:

1 tablespoonful (10 ml) three times daily.

Children:

2-5 years:

1/2 teaspoonful (2.5ml) three times daily.

6-12 years:

1 teaspoonful (5 ml) three times daily.

STORAGE:

Store at room temperature below 25°C. Keep out of the reach of children.

HOW SUPPLIED:

AZMIXINAL syrup:

125 mL with a measuring cup.

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product but unlike any other products.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament, the physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Council of Arab health Ministers & Union of Arab Pharmacists



Ibn Al Haytham
Pharma. Co.

Aleppo - Syria



Tel.: +963 (0)21 5210359 info@ibn-alhaytham.com
Fax: +963 (0)21 5210335 www.ibn-alhaytham.com