

# ميكوستوب ٠,٢ % محلول نسائي

تيوكونازول

التركيب:

كل ١٠٠ غ ميكوستوب ٠,٢ % محلول نسائي يحتوي على : تيوكونازول ٢٠٠ ملغ.  
التأثير الدوائي:

يعتبر تيوكونازول مضاد فطري صناعي واسع الطيف يمنع نمو الخمائر المرضية لدى الإنسان. يظهر تيوكونازول فعالية قاتلة للفطور تجاه فطور مبيضات البيض والأنواع الأخرى من جنس الفطور.

الاستطباب:

يوصف ميكوستوب ٠,٢ % محلول نسائي للإراحة من الحكمة المهبلية وحس الحرقنة والإفرازات المترافقة مع الإصابة المهبلية المتكررة بالخمائر (داء المبيضات البيض المهلي) والتريكوموناس. مضادات الاستطباب:

يعتبر ميكوستوب مضاد استطباب لدى الأشخاص الذين تظهر لديهم حساسية لمضادات الفطور من زمرة إيميمازول. لم يثبت حتى الآن أمان استخدام هذا الدواء خلال الحمل.

تحذيرات:

- يستخدم فقط إذا تبين وجود إصابة فطرية مهبلية حديثة تم تشخيصها من قبل الطبيب ولدى وجود بعض الأعراض وإذا يجب استشارة الطبيب وتشمل هذه الأعراض حكة وحرقنة في الأعضاء التناسلية وأحياناً إفرازات بيضاء.

- إذا لم يحدث تحسن خلال ثلاثة أيام أو إذا لم تختف الأعراض خلال سبعة أيام يجب استشارة الطبيب لأنه ليس كل الإصابات المهبلية تسببها الفطور.

- يجب استشارة الطبيب في حال حدوث ألم بطني أو حمى أو وجود رائحة كريهة للإفرازات المهبلية قبل أو أثناء المعالجة بهذا الدواء.

- إذا حدث طفح جلدي أو تخریش جلدي جديد يجب إيقاف استخدام الدواء.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

ميكوستوب ٠,٢ % محلول نسائي: يدخل حافن معبأً بالفوسل داخل المهبل مرة واحدة في اليوم لمدة خمسة أو ستة أيام. إعادة المعالجة يمكن أن تكون فعالة للمريضات اللواتي تحسنت لديهن الإصابة ولكن لم تشف بالمعالجة الأولى. التأثيرات الجانبية وتحذيرات خاصة:


تم تسجيل حدوث أعراض تخريش موضعي لدى بعض المريضات خلال الاستعمال وتظهر هذه الأعراض باكراً خلال المعالجة وتكون مؤقتة ومعتملة. على كل حال إذا زادت تفاعلات الحساسية مع استعمال ميكوستوب يجب إيقاف المعالجة.

العبوة:

ميكوستوب ٠,٢ % محلول نسائي: عبوة بلاستيك سعة ١٥٠ مل محلول مع حافن.

شروط الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ م بعيداً عن متناول الأطفال.



## إن هذا دواء

- دواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- دواء مستحضر يؤثر على صحتك واسئلاكه خلافاً لتعليقات بعضك للفطر.
- اتبع بدقة وصمة الطبيب وطريقة الاستعمال النصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- تطابق والصيغ التي هما الخبيرين بالدواء وتعمه وصبره.
- لا تطلع مدة العلاج المخلدة من ثلاثة نمسك ولا ترد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبداً في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب



ابن الهيثم للصناعات الدوائية



حلب - سورية - هاتف: ٣٥١-٥٥١٠٠٠٠ (٠) ٦٦٢٠٠٠٠٠ فاكس: ٣٥٠-٥٥١٠٠٠٠٠ (٠) ٦٦٢٠٠٠٠٠٠  
مريد الإلكتروني: hzm@mail.sy - الموقع على الإنترنت: www.ibn-alhaytham.com

# Micostop 0.2% Vaginal Solution

Tioconazole

Composition:

Each 100g Micostop 0.2% vaginal solution contain: 200 mg Tioconazole.

Pharmacological Action:

Tioconazole is a synthetic broad spectrum antifungal agent that inhibits the growth of human pathogenic yeasts. Tioconazole exhibits fungicidal activity against Candida albicans, and other species of the genus Candida.

Indications:

Micostop 0.2% vaginal solution is indicated for the relief of vaginal itching, burning and discharge associated with recurrent vaginal yeast infections (vaginal candidiasis) and trichomonas.

Contraindications:

Micostop is contraindicated in individuals who have been shown to be hypersensitive to imidazole antifungal agents. Safety in pregnancy has not been established.

Warnings:

Use only if you have already had a vaginal yeast infection diagnosed by a medical practitioner and you have the same symptoms now, otherwise consult your doctor. These symptoms include itching and burning of the vagina and sometimes a white discharge. If there is no improvement in 3 days or if symptoms have not disappeared within seven days, then consult a medical practitioner as not all vaginal infections are caused by yeasts. Consult a medical practitioner if you have abdominal pain, fever or a foul - smelling vaginal discharge before or during use of this medication. If symptoms recur within 2 months, consult a medical practitioner. If skin rash or a new irritation occurs, discontinue use

Dosage and directions for use:

Micostop 0.2% vaginal solution: Insert one applicator-full intravaginally once a day for 5 - 6 days. A repeat course may be effective in patients who are improved but not cured by the initial course.

Side Effects and Special Precautions:


Symptoms of local irritation have been reported by some patients during use. They are usually seen early during the course of treatment and are transient and mild. However, if a sensitivity reaction develops with the use of Micostop, treatment should be discontinued and appropriate therapy instituted.

Presentation:

Micostop 0.2% vaginal solution: Bottle containing 150 ml solution with applicator.

Storage:

Store below 30°C, out of the reach of children.



## THIS IS A MEDICATION

- A medication is a product but unlike any other products.
- A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the physician's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication, the physician and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your physician.

KEEP THE MEDICATIONS OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Council of Arab health Ministers & Union of Arab Pharmacists



Ibn Al Haytham Pharma - Industries Co.

Alppo-Syria Tel. : +963 (0)21 5210359 - Fax : +963 (0)21 5210335  
E-mail: hzm@mail.sy - Web site : www.ibn-alhaytham.com

